

Boletín Informativo de Tratamientos

Nº 10

Noviembre 2014

▶ FRUTALES EN GENERAL

Durante el período de caída de hoja se producen pequeñas heridas por donde pueden penetrar hongos y bacterias como: Fusicocum, Cribado, Aboladura, Cytospora, etc. en Frutales de Hueso, y de Moteado, Septoria, Chancros, Pseudomonas en Frutales de Pepita, que se ven favorecidas por lluvias, rocíos, y nieblas.

Por otro lado y dado el incremento de casos de FUEGO BACTERIANO en Peral y Manzano hace más necesario que nunca los tratamientos de caída de hoja con Cobre, que además nos servirán para el control de las enfermedades citadas anteriormente:

COBRE NORDOX® 75 WG**200 grs/Hl**

- 1º) Inicio de Caída de Hoja
- 2º) 50% de Caída de Hoja
- 3º) 100% de Caída de Hoja

Para el control de la Bacteriosis (Xantomonas pruni) detectada en algunas plantaciones de Frutales de Hueso se recomienda efectuar 2 tratamientos a caída de hoja, reforzándolo con un tratamiento al hinchazón de yemas (Estadio A-B, a finales de Enero-Febrero) i otro en botón rosa (Estadio E) con **COBRE NORDOX® 75 WG**

En aquellas fincas con problemas graves de Moteado i/o Stemphilium en Frutales de Pepita durante la pasada campaña frutera es muy recomendable añadir en el 2º ó 3º tratamiento: UREA FOLIAR a una dosis de 5 kg/Hl., según problemática, para contribuir a la descomposición de las hojas.

▶ OLIVO

En muchas zonas se ha comenzado ya la recolección de las aceitunas.

Con este boletín os queremos recordar que resulta imprescindible tratar con fungidas cúpricos después de la recolección mecánica, con el fin de cicatrizar las heridas que provoca la maquinaria de recolección, principalmente aquellas recolectadas con maquinas vibradoras.

Tratar de inmediato después de la recolección con:

COBRE NORDOX 75 WG**200 grs/Hl**