

Boletín Informativo de Tratamientos

Nº 3

Marzo 2015

► Melocotonero y Nectarina

Recordar que las variedades de melocotonero/nectarina sensibles a Trips es necesario iniciar los tratamientos a final de floración.

TALITA 500 cc/1000 lts de agua



Durante el mes de Marzo y Abril nos encontramos en período de sensibilidad a Abolladura y Cribado en hoja, además hay que prevenir los ataques de Anarsia y Pulgón, por tanto, proteger las plantaciones a partir de caída de pétalos con:

DANTOP 50 WG 120 grs/1000 lts de agua

+

DACONIL 50 SC 2,5 lts/1000 lts de agua

+

AKIRA 500 grs/1000 lts de agua

En nectarina y en aquellas variedades de melocotón sensibles a Oídio será necesario iniciar los tratamientos a partir de este momento, se puede añadir al tratamiento anterior **MASSOCUR 12,5 EC** a 500 cc/1000 lts agua

► Ciruelo

Durante el período de caída de pétalos habrá que tener protegidas las plantaciones contra el ataque de Cribado, Pulgones y Anarsia. Se aconseja tratar con:

AKIRA a 500 grs/1000 lts

+

BLANCADO 80 WG a 1,5 Kgs/1000 lts




En aquellas zonas y/o variedades con problemas de Oídio se puede emplear **MASSOCUR** ó **MASSOCUR COMBI**

► Cerezo

En caso de lluvias durante el período de floración, tratar para el control de Monilia con:

GAVELAN 50 SC 1 - 1,5 lts/1000 lts



Boletín Informativo de Tratamientos

Nº 3

Marzo 2015

► Albaricoquero

En el período de caída de pétalos hay que continuar protegiendo las plantaciones contra Monilia, y prevenir ataques de insectos (Anarsia,... etc) se recomienda tratar con:

DACONIL 50 SC	a	2,5 lts/1000 Lts
+		
AKIRA	a	500 grs/1000 Lts



En caso de variedades sensibles a Oídio añadir:

MASSOCUR 12,5 EC		500 cc/1000 Lts
-------------------------	--	-----------------

► Manzano -Tratamiento prefloral -

Durante la 2ª quincena de Marzo llegaremos al estadio fenológico C₃-D, en el que se recomienda tratar para combatir formas invernantes de plagas y enfermedades como: Piojo de San José, Ácaros, Pulgones, Moteado, Oídio. El tratamiento a efectuar será:

ATOMINAL 10 EC		500 cc/1000 Lts
+		
IVENOL MASSÓ		10 Lts/1000 Lts
+		
COBRE NORDOX 75 WG		2 Kgs/1000 Lts
+		
MASSOCUR 12,5 EC		0,5 Lts/1000 Lts



En plantaciones donde el pasado año pasado hubo problemas de Araña Roja y con presencia de puesta invernal puede ser una buena opción un tratamiento ovicida prefloral para el control de puesta invernal de araña con:

SENTO		500 cc/1000 Lts
+		
IVENOL MASSÓ		2,5 Lts/1000 Lts

Boletín Informativo de Tratamientos

Nº 3

Marzo 2015

► Todos los frutales

En aquellas plantaciones con problemas de Phytophthora se puede tratar a través del sistema de riego localizado a partir del 2º riego con alguno de estos productos:

CILUS Plus 200 grs/Ha

En caso de tratamiento foliar emplear:

PUNTAL 80 WG 2,5 Kg/1000 lts (solo frutales pepita)

► Almendro

A partir de caída de pétalos iniciar los tratamientos contra Cribado, vigilar la presencia de Pulgón en los brotes más tiernos y tratar al observar los primeros síntomas.

BLANCADO 80 WG 1,5 Kgs/1000 Lts

+

PRINCIE 500 cc/1000 lts

+

WELGRO STANDARD 2,5 Kg/1000 Lts



► Olivo

A partir del momento que se inicie la nueva brotación, efectuar un tratamiento con:

COBRE NORDOX 75 WG 2 Kg/1000 Lts

+

WELGRO BORO 4 Kg/1000 Lts

+

WELGRO AMINO 2,5 Lts/1000 Lts

En caso de problemas graves de Repilo se recomienda añadir al tratamiento anterior TACTIC a razón de 100 grs/1000 Lts

Ahora es un buen momento para iniciar los tratamientos herbicidas en Olivo, sobre todo si se tienen problemas de Coniza o pinitos, se recomienda el siguiente tratamiento:

ZERMAT a 2 lts/Ha

+

LOGRADO a 3 lts/Ha

+

MAXOFEN a 2-3 lts/Ha

