

Boletín Informativo de Tratamientos

Nº 5

Abril 2015

► **Manzano: Estrategias Russeting, Cuajado, y Alargamiento Fruto.**

Durante el período de Floración-Cuajado del fruto se decide el éxito de la próxima cosecha, conviene asegurar un buen cuajado. Para ello hay que tener presentes aspectos como: polinización y presencia de abejas, fertilización, y climatología.

Las disponibilidad de nutrientes (N, P₂O₅, y microelementos) es máxima en el periodo de floración/cuajado/crecimiento inicial del fruto (periodo de división celular). Así pues resulta imprescindible poner a disposición de la planta los citados y complementar la fertilización al suelo, con tratamientos foliares puntuales en estos períodos.

► **Programa Antirrusseting en GOLDEN's, FUJI's, PINK LADY**

80-100% Floración



1º Tratamiento

NOVAGIB®	500 cc/ 1000 lts
WELGRO® BORO DF	1,5 Kgs/1000 lts
WELGRO® Zinc	2,5 lts/1000 lts
MASSOCUR® Combi	7,5 Kgs/1000 lts
BLANCADO® 80 WDG	1,5 Kgs/1000 lts

7-8 días después del anterior



2º Tratamiento

NOVAGIB®	400 cc/1000 lts
WELGRO® BORO DF	1,5 Kgs/1000 lts
QUIMAZUFRE®	5,0 Kgs/1000 lts
BLANCADO® 80 WDG	1,5 Kgs/1000 lts

7-8 días después anterior



3º Tratamiento

NOVAGIB®	300 cc/1000 lts
WELGRO® BORO DF	1,5 Kgs/1000 lts
MASSOCUR Combi®	7,5 Kgs/1000 lts
BLANCADO® 80 WDG	1,5 Kgs/1000 lts

7-8 días después anterior



4º Tratamiento

NOVAGIB®	300 cc/1000 lts
WELGRO® BORO DF	1,5 Kgs/1000 lts
QUIMAZUFRE®	5,0 Kgs/1000 lts
BLANCADO® 80 WDG	1,5 Kgs/1000 lts

Boletín Informativo de Tratamientos

Nº 5

Abril 2015

► Programa Cuajado-Alargamiento RED DELICIOUS y similares

25% Floración



1^{er} Tratamiento

PERLAN®	500 cc/1000 lts
WELGRO® STANDARD	1,0 Kg/1000 lts
WELGRO® BORO DF	2,0 Kgs/1000 lts
WELGRO® MAR Crema	2,0 lts/1000 lts

60% Floración



2^o Tratamiento

PERLAN®	500 cc/1000 lts
WELGRO® Zinc	2,5 lts/1000 lts
WELGRO® BORO DF	2,0 Kgs/1000 lts
MASSOCUR® 12,5 EC	0,5 lts/1000 lts

► Programa Mejora calidad Grupo GALA

50% Floración



1^o Tratamiento

PERLAN®	300 cc/1000 lts.
WELGRO® STANDARD	1,0 Kg/1000 lts
WELGRO® BORO	1,5 Kgs/1000 lts
WELGRO® MAR Crema	2,0 lts/1000 lts

100% Floración



2^o Tratamiento

PERLAN®	300 cc/1000 lts
WELGRO® BORO	1,5 Kgs/1000 lts
WELGRO® Zinc	2,5 lts/1000 lts
MASSOCUR® Combi	7,5 Kgs/1000 lts

Boletín Informativo de Tratamientos

Nº 5

Abril 2015

► Manzano Tratamientos Aclareo

En variedades de difícil aclareo, exceso de flor, ó tendencia a la alternancia se puede hacer un primer aclareo a partir del inicio de caída de pétalos y hasta un Ø medio del fruto central en madera de 2 años de 4-5 mm, con **AMID-THIN**. Cuanto más cerca del inicio de caída de pétalos se aplique, más se acentúa la acción de aclareo. Según variedades se recomienda tratar:

GOLDEN y GRANNY	(F ₂ + 3 a 5 días)
GALAXIA	(F ₂ + 4 a 5 días)
FUJI's	(F ₂ + 2 a 3 días)
PINK LADY	(F ₂ + 2 a 5 días)

AMID- THIN	a	600 grs/1000 lts
+ MOGIOL	a	500 cc/1000 lts

Condiciones climáticas óptimas de tratamiento:

12°C < T < 20°C algunas horas después del tratamiento.

Humedad Relativa (HR) > 70%

Evitar las horas de máxima insolación. Cuanto más tiempo tarde en secarse el tratamiento mes eficaz será

Este tratamiento hace un primer aclareo selectivo, habrá que complementarlo con estrategias posteriores de aclareo con tal de dejar el número de frutos por árbol adecuado. Más adelante enviaremos un boletín con las diferentes estrategias de aclareo.